

SÍFILIS

¿QUÉ ES?

Es una **infección de transmisión sexual (ITS)** producida por una bacteria "Treponema pallidum." La infección evoluciona en varias fases: primaria, secundaria, latente y terciaria.

ES FUNDAMENTAL LA DETECCIÓN PRECOZ

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tiene la infección, a través de sexo vía vaginal, oral y anal. Las mujeres embarazadas pueden transmitir la enfermedad a su hijo/a.


¿QUÉ AUMENTA EL RIESGO DE INFECCIÓN?

MÚLTIPLES CAMBIOS DE PAREJA SIN PROTECCIÓN;
sea vía oral, vaginal o anal
siendo la vía anal la que mayor riesgo supone.

SITUACIÓN DE LA INFECCIÓN

CASOS ANDALUCIA
AÑOS 2018/ 2022

4.770



En el año 2020 se produce un descenso respecto a 2019, en las declaraciones de Red Alerta, debido a la pandemia COVID-19.

En el año 2021 y 2022 se ve un aumento del número de casos con tendencia al alta.

Grupo de edad mayoritario: 30-34 años.



FUENTES:

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/archivos%20A-Z/SIFILIS/Vigilancia_ITs_1995_2019.pdf

<https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/PROTOCOLOS/Protocolo%20de%20Vigilancia%20de%20S%C3%ADfilis.pdf>

Monografía vol 26 nº 10

Infecciones de transmisión sexual en Andalucía. Años 2015-2020

Redalerta: RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

FORMAS CLÍNICAS



¿CÓMO SABER SI LA TENGO?

Mediante un **análisis de sangre** para detectar anticuerpos frente a esta infección.

Si tiene una **úlcera** será necesario **tomar una muestra** de ella para hacer el diagnóstico.

Si tiene sífilis también debe hacerse **pruebas** para detectar infección por **otras ITS como VIH**, ya que puede haber contraído más de una infección al mismo tiempo

¿EXISTE CURA? **SÍ**

TRATAMIENTO

Penicilina

PRUEBA DE CURACIÓN
TEST CONTROL REAGÍNICO RPR
a los 3, 6 y 12 meses.

SIN TRATAMIENTO

Daños en todo el cuerpo.

Aumenta el riesgo de infección por VIH, problemas en el embarazo afectando a recién nacido, problemas graves a largo plazo.

Aunque usted haya tenido una infección por sífilis en el pasado y se haya tratado correctamente; puede volver a contraerla, ya que no genera protección para toda la vida.

Tras el tratamiento alguna prueba puede seguir dando positivo. **Informe a su médico.**

¿CÓMO SE PREVIENE?

Evitar relaciones sexuales de riesgo.

Si es sexualmente activo, deberá seguir las siguientes recomendaciones para disminuir las probabilidades:



Uso correcto del preservativo.

Usar de inicio a fin en la relación sexual. Usar uno nuevo si tiene sexo oral vaginal y anal. Si hay varias personas durante la relación sexual cambiarlo de una persona a otra.

Si se comparten juguetes sexuales para la penetración, es importante un preservativo para cada persona.



Notificar el contacto sexual.

La notificación al profesional sanitario DE LOS CONTACTOS SEXUALES es confidencial y puede ayudar a limitar la propagación de la sífilis.

PUNTOS CLAVE:

- La sífilis es una infección de transmisión sexual.
- La sífilis puede aumentar el riesgo de infectarse por VIH, hasta 4 veces más.
- Se transmite fácilmente de una persona a otra durante las relaciones sexuales no protegidas.
- Con frecuencia no presenta síntomas.
- Si no se trata produce problemas graves a largo plazo.
- Se puede proteger usando **SIEMPRE** preservativo.

“**PROTEGERSE**
ES PROTEGER”



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Consejería de Salud y Consumo

Redacción y diseño: AGS Campo de Gibraltar Este y Oeste

UGC Salud Pública, Epidemiología y Vigilancia de la Salud

