

TRICOMONA

¿Qué es?

Es una infección de transmisión sexual causada por el parásito "Trichomonas vaginalis"
La persona afectada puede tener diversos síntomas o no presentar ninguno.
La tricomoniasis es la ITS curable más frecuente en todo el mundo.

DATOS DE INTERÉS

EDAD MEDIA
DE LAS
PERSONAS
AFECTADAS

40-50
AÑOS

FUENTE: OMS



TRICOMONA VAGINALIS
AL MICROSCOPIO

La infección es asintomática en al menos un 50% de las mujeres y un 70-80% de los hombres. Aunque los hombres son portadores del parásito, rara vez presentan síntomas de la infección, aunque puede haber una uretritis.


FUENTE: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-vaginitis-por-trichomonas-13072712>

Mantener relaciones sexuales con un caso infectado con Tricomonas Vaginalis supone un riesgo de transmisión de entre un 30% a un 80%.

FUENTE: https://www3.paho.org/nq/index.php?option=com_content&view=article&id=14868:sti-trichomoniasis&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0

¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Los síntomas pueden ser desde una leve irritación genital hasta una inflamación más acusada.



¿CUANDO SE MANIFIESTA?

De 5 a 28 días después del contacto sexual sin protección con una persona infectada. Este periodo puede ser mayor.

¿CÓMO SE CONTRAE?

- Persona a persona en la relaciones sexuales sin protección.
- Durante la relación sexual el parásito se transmite de pene a vagina, de vagina a pene y de vagina a vagina.
- No es frecuente que infecte otras partes del cuerpo, como las manos, boca o el ano.

¿CÓMO SE PREVIENE?

- El uso de preservativo reduce el riesgo de contraer o transmitir la tricomoniasis y otras ITS.
- Si se comparten juguetes sexuales, en la penetración, es importante utilizar un preservativo para cada penetración y para cada persona.
- Los juguetes sexuales se recomiendan de uso individual.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

- Mediante una muestra de exudado de la zona genital afectada o bien mediante una citología.



SI TENGO TRICOMONA

Tratar siempre a las parejas sexuales.

Es importante que se informe a los contactos sexuales conocidos o faciliten su contacto para realizar pruebas y poder tratar.

No se recomienda realizar prueba de curación. Si los síntomas persisten recoger una nueva muestra.

Se recomienda despistaje de otras ITS*.

Evitar mantener relaciones sexuales hasta que la persona afectada y las parejas sexuales, hayan finalizado el tratamiento y los síntomas hayan desaparecido.

ITS* INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL

TRATAMIENTO

Metronidazol o Tinidazol



Si no se trata, puede producir enfermedad inflamatoria en diferentes niveles del aparato genital.

La transmisión del VIH, es facilitada en el contexto de una infección de Tricomonas.

La infección por tricomonas puede aumentar el riesgo de contraer o transmitir otras ITS.

**"PROTEGERSE
ES PROTEGER"**

Fuentes:

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
- <https://www.guiaprivocom.com/indice/vulvovaginitis>
- <http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfleisiones/enftransmisibles/sida/homeITS.htm>
- Redacción y diseño: UGC SALUD PÚBLICA, EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA DE LA SALUD.



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Consejería de Salud y Consumo
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR